



KARTAGENER SYNDROM UND PRIMÄRE CILIÄRE DYSKINESIE e.V.

Wichtiger Hinweis zur Keim-Problematic

Die Diskussion um eine mögliche Kreuzinfektion mit Pseudomonas-Stämmen oder anderen Keimen von Patienten untereinander wird kontrovers geführt. Eine absolute Sicherheit, **Kreuzinfektionen** auszuschließen, gibt es nicht. **Aber der Gewinn, den die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Begegnung und dem Erfahrungsaustausch vor Ort ziehen, ist groß.**

Deshalb haben sich die im Verein Kartagener Syndrom und Primäre Ciliäre Dyskinesie e. V. organisierten erwachsenen Betroffenen und Eltern dafür ausgesprochen, regelmäßig Veranstaltungen für Betroffene durchzuführen. **Das geringe Risiko der Kreuzinfektion von Patienten untereinander lässt sich durch folgende Verhaltensregeln und Maßnahmen weiter verkleinern:**

Bitte informieren Sie sich durch regelmäßige Sputumuntersuchungen über das eigene Keimspektrum und die Resistenzsituation.

Bitte desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände. Desinfizieren Sie in jedem Fall die Hände, wenn Sie Ihr Zimmer verlassen. Desinfektionsmittel erhalten Sie zu Beginn der Veranstaltung.

Bitte halten Sie beim Husten und Niesen ein Taschentuch oder den Ellenbogen vor Mund bzw. Nase.

Bei Übernachtungen: Nutzen Sie möglichst die Toiletten in den eigenen Räumen.

Bitte geben Sie sich nicht die Hände, wenn Sie aktuell infektiös / erkältet sind oder dies in den letzten Tagen waren. *Wir mögen alle auch ohne Händedruck...*

Besondere Rücksichtnahme sollten jugendliche und erwachsene Betroffene sowie Eltern gegenüber den teilnehmenden Kindern zeigen.

Ein verantwortlicher und rücksichtsvoller Umgang im Hinblick auf die Entsorgung des Sputums kann – so denken wir – vorausgesetzt werden.

Bitte seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst und beachten Sie die hygienischen Grundregeln.

Patienten, die von sich wissen, dass sie mit seltenen, aber sehr gefährlichen Problemkeimen infiziert sind, werden gebeten, auf die Teilnahme an der Veranstaltung aus Rücksicht auf die anderen Teilnehmer/innen zu verzichten.

Dies betrifft folgende Keime: 3 MRGN, 4 MRGN, MRSA, Burkholderia cepacia und ähnliche.